

## URINA SEGUNDO JATO – COLETA EM HOMENS (EAS e cultura)

Revisão 0.2

### FUNDAMENTOS PARA QUE O EXAME SEJA CORRETO

**MATERIAL:** Urina de 2º jato (jato intermediário)

**RECIPIENTE:** Preferencialmente deve-se utilizar o frasco fornecido pelo Laboratório. Os frascos adquiridos em farmácias ou fornecidos por outros laboratórios clínicos também poderão ser utilizados.

### **PROCEDIMENTO:**

- Lavar as mãos com água e sabão;
- Expor a glande e lavar com água e sabão. Enxaguar com água em abundância;
- Enxugar com toalha de pano limpa ou papel descartável;
- Expor a glande e manter o prepúcio retraído;
- Desprezar o 1º jato de urina no vaso sanitário;
- Sem interromper a micção colocar o frasco de coleta na frente do jato urinário (jato intermediário) e colher ± 20 a 50 mL de urina. Evitar tocar na parte interna do frasco;
- Desprezar o restante de urina (jato final) no vaso sanitário;
- Fechar o frasco adequadamente e encaminhá-lo imediatamente para o Laboratório.

### **OBSERVAÇÕES:**

1. O tempo de percurso até o laboratório deverá ser inferior à uma hora em temperatura ambiente. Sendo superior, o armazenamento e o transporte deverá ser realizado em temperatura refrigerada em frasco, isopor ou sacola contendo algumas pedras de gelo.
2. Não colocar gelo diretamente na amostra de urina colhida;
3. Não congelar;
4. Caso o paciente faça uso de algum medicamento o mesmo só deverá ser suspenso com autorização do médico.

**Horários de Funcionamento: 2ª à sábado: 06:30 às 19 horas / URGÊNCIA – 24 horas**

Endereço: Rua Angélica Mota, 137 Olaria – Rio de Janeiro – RJ

CEP 21. 021-490 (PABX) 3977.2000

Recepção: 3977.2126 e 3977.2127

Home page: [www.hospitalbalbino.com.br](http://www.hospitalbalbino.com.br)

Email: [laboratório@hospitalbalbino.com.br](mailto:laboratório@hospitalbalbino.com.br)