

URINA SEGUNDO JATO – COLETA EM MULHERES (EAS e cultura)

Revisão 0.2

FUNDAMENTOS PARA QUE O EXAME SEJA CORRETO

MATERIAL: Urina de 2º jato (jato intermediário)

RECIPIENTE: Preferencialmente deve-se utilizar o frasco fornecido pelo Laboratório. Os frascos adquiridos em farmácias ou fornecidos por outros laboratórios clínicos também poderão ser utilizados.

PROCEDIMENTO:

- Lavar as mãos com água e sabão;
- Lavar a região vaginal com água e sabão. Enxaguar com água em abundância (retendo a urina);
- Enxugar, de frente para traz, com uma toalha de pano limpa ou papel descartável;
- Assentar no vaso sanitário, afastar os grandes lábios e mantê-los afastados;
- Desprezar o 1º jato de urina no vaso sanitário;
- Sem interromper a micção colocar o frasco de coleta na frente do jato urinado e colher \pm 20 a 50 mL de urina. Evitar tocar na frente do frasco;
- Desprezar o restante de urina no vaso sanitário;
- Fechar o frasco adequadamente e encaminhá-lo imediatamente para o laboratório.

OBSERVAÇÕES:

1. O tempo de percurso até o laboratório deverá ser inferior à uma hora em temperatura ambiente. Sendo superior, o armazenamento e o transporte deverá ser realizado em temperatura refrigerada em frasco, isopor ou sacola contendo algumas pedras de gelo.
2. Não colocar gelo diretamente na amostra de urina colhida;
3. Não congelar;
4. Caso o paciente faça uso de algum medicamento o mesmo só deverá ser suspenso com autorização do médico.

Horários de Funcionamento: 2ª à sábado: 06:30 às 19 horas / URGÊNCIA – 24 horas

Endereço: Rua Angélica Mota, 137 Olaria – Rio de Janeiro – RJ
CEP 21.021-490 (PABX) 3977.2000 Recepção: 3977.2126 e 3977.2127

Home page: www.hospitalbalbino.com.br

Email: laboratório@hospitalbalbino.com.br